

BIOFERMIN® 氧化鎂便秘藥

- ◆不易引起腹痛的非刺激性成分
氧化鎂成分不會直接刺激腸道，因此重複服用亦不易引起腹痛或導致依賴。
- ◆協助近乎自然的排便
氧化鎂於大便中收集水份，能適當地軟化硬便，令排便變得輕鬆。
- ◆乳酸菌有效舒緩便秘
乳酸菌調整不良的腸內環境，改善便秘。

療效

- 便秘
- 緩和伴隨便秘的下列症狀：皮膚粗糙、粉刺、頭重、上火、食欲不振（食欲減退）、痔瘡、腸內異常發酵、腹部膨脹

用法及用量

請將以下分量，1天1次，於睡前（或空腹時）用冷水或微溫水服用。不過，請於首次使用最少用量，然後視排便情況或狀態，再逐漸增量或減量。

- 15歲以上，1次3~6片，1天1次
- 11歲~14歲，1次2~4片，1天1次
- 7歲~10歲，1次2~3片，1天1次
- 5歲~6歲，1次1~2片，1天1次
- 未滿5歲者，請勿服用

用法及用量相關的注意事項

- 請嚴守用法及用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 因可能引致卡喉，請勿讓未滿5歲的幼兒服用。

成分

6錠中（15歲以上的每日最大服用量）

氧化鎂 2,000mg

乳酶生（乳酸菌） 20mg

添加劑

纖維素，交聯羧甲基纖維素鈉，硬脂酸鈣

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品

其他瀉下藥（瀉藥）

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
年長者。
有下列症狀的人。
劇烈腹痛，噁心、嘔吐
接受過下列診斷的人。
腎臟病
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶附上說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
消化器官：劇烈腹痛，噁心、嘔吐
精神神經系統：強烈睡意，意識模糊
循環器官：起身時暈眩，脈搏變慢
呼吸器官：呼吸困難
其他：肌力低下，口乾
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或加劇時，請停止服用，攜帶附上說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

腹瀉

- 即使服用 1 週左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶附上之說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質。)
- 開瓶後請將瓶中填充物丟棄。
(填充物為防止運送過程錠劑破損之用。若將此填充物取出後又再次放入瓶中，可能含濕氣而造成錠劑變質，或導致混入異物。)
- 瓶內放有乾燥劑，請勿服用。
- 每次服用後請旋緊瓶蓋。
(避免吸收其他氣味或濕氣而造成變質。)
- 請勿服用超過使用期限的產品。
- 請於外盒及外瓶「開封年月日」填寫欄內填入開瓶日期。
- 基於品質考量，一旦開封，請於開封日起 6 個月內儘速服用完畢。

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。