

ヘルペシアクリーム 購入前チェックシート

ヘルペシアクリームを購入する前に以下の「チェック項目」「使用上の注意」を確認してください。

ヘルペシアクリームをご購入いただく前に、まずは以下をチェックしてみましょう。

1. 次の項目に該当する場合

・ こういう症状が初めてですか?

YES NO

・ 患部が広範囲

・ 水疱が大きい（小豆大）

・ 頭痛がありますか？

・ 疼痛がひどいですか？

・ アシクロビル又はバラシクロビル製剤に
アレルギー症状を起こしたことがありますか？

・ 使用者は 6才未満の乳幼児ですか？

・ 患部が唇とそのまわりをのぞく部位ですか？

1つでも YES に該当する場合は医師の治療を受けてください。

2. 1の項目がすべて NO の場合

右記の説明や製品に記載された事項をよくお読みになり、購入してください。

※薬局・薬店で薬剤師から説明を受け購入ください。

■ 使用上の注意

- ◇ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。
(1) 初めて発症したと思われる人、患部が広範囲の人。(初めて発症した場合は症状がひどくなる可能性があり、患部が広範囲に及ぶ場合は重症ですので、医師の治療を受けてください)
(2) 本剤、本剤の成分又はバラシクロビル製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(本剤の使用により再びアレルギー症状を起こす可能性があります)
(3) 6才未満の乳幼児。(乳幼児の場合、初めて感染した可能性が高いと考えられます)
 2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲。(目に入つて刺激を起こす可能性があります)
(2) 唇とそのまわりをのぞく部位。(口唇ヘルペスは唇及びその周囲にできるものです)

◇ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(医師から処方されている薬に影響したり、本剤と同じ薬を使用している可能性もあります)
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(薬の使用には慎重を期し、専門医に相談して指示を受ける必要があります)
(3) 授乳中の人。(同じ成分の医療用の内服薬で、乳汁への移行が確認されています)
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(薬などでアレルギーを起こした人は、本剤でも起こる可能性があります)
(5) 温湯やただれがひどい人。(症状がひどい場合は専門医に相談して指示を受ける必要があります)
(6) アトピー性皮膚炎の人。(重症化する可能性がありますので専門医に相談して指示を受ける必要があります)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激感、疼痛、乾燥、灼熱感、落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、じんましん

(本剤によるアレルギー症状であるか、本剤の薬理作用が強くあらわれたものであると考えられ、このような場合、同じ薬を続けて使用すると症状がさらに悪化するおそれがあります)

3. 5日間位使用しても症状がよくならない場合、又はひどくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください(5日間位使用しても症状の改善が見られない時は、症状が重いか他の疾病によるものと考えるべきで、なるべくはやく医師又は薬剤師に相談してください)



第1類医薬品

- 効能・効果
口唇ヘルペスの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)

- 用法・用量
1日3~5回、適量を患部に塗布してください。
(唇やそのまわりにヒリヒリ、チクチクなどの違和感をおぼえたら、すぐに塗布してください)

- 成分
1g 中
アシクロビル 50mg
添加物: グリセリン、ジメチルポリシロキサン、ステアリルアルコール、プロピレングリコール、流動パラフィン、I-メントール、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート 60、パラベン、ケエン酸、ケエン酸 Na