

# TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE<GRANULES>

- 肠胃活动迟缓的话，就会出现胃胀等不舒服的症状。另一方面，过度的运动、肌肉紧张也会引起胃痛、腹痛等。
- TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE 通过安中散和芍药甘草汤的组合，调理肠胃的活动，使肠胃接近原来的状态。
- 是一款适合平时就有肠胃虚弱，或因不规则的饮食生活和苦夏等情况出现肠胃不适，以及没有食欲的人士服用的肠胃药。对想好好享受饮食的人，想改善胃的疲劳状况的人等的胃胀·不舒服，胃炎等的胃肠道症状进行改善。
- 对胃痛、腹痛也有疗效。
- 此药剂为香味、口味佳的颗粒型药剂。
- 从 5 岁到老年人都可以服用。

## 效能

胃胀、胃部不适感、胃炎、胃痛、打嗝、食欲不振、腹部胀满感、胸闷、烧心、胃酸过多、腹痛、恶心（想吐、恶心）

## 用法及用量

在饭前或饭间，请按以下用量并配合水或温开水服用：

成年人（15 岁以上），1 次 1 包，1 天 3 次

5 岁～14 岁，1 次 1/2 包，1 天 3 次

未满 5 岁，不宜服用

## 注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

## 成分

1 包 (1.02g) 中

安中散 700mg

（桂皮 200mg，延胡索 150mg，牡蛎 150mg，茴香 75mg，缩砂 50mg，甘草 50mg，良姜 25mg）

芍药甘草汤香 140mg

（芍药 280mg，甘草 280mg）

## 添加剂

二氧化硅，马铃薯淀粉，乳糖，纤维素，羟丙基纤维素，滑石

## 注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变

## 使用注意事项

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师治疗的人群。
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
皮肤：起疹发红、发痒
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。  
肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
- 若服用 1 个月左右后症状仍无改善请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
- 将 1 包分开服用时，折叠袋口进行保管，并在 2 天之内服用。
- 请勿服用超过使用期限的产品。

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。】