

TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE<GRANULES>

- 腸胃活動遲緩的話，就會出現胃脹等不適的症狀。另一方面，過度的運動、肌肉緊張也會引起胃痛、腹痛等。
- TAISHO KAMPO STOMACH MEDICINE 通過安中散和芍藥甘草湯的組合，調理腸胃的活動，使腸胃接近原來的狀態。
- 是一款適合平時就有腸胃虛弱，或因不規則的飲食生活和苦夏等情況出現的腸胃不適，以及沒有食欲的人士服用的腸胃藥。對想好好地享受飲食的人、想改善胃疲勞狀況的人等，能改善其胃脹及不適，胃炎等的胃腸症狀。
- 對胃痛、腹痛也有療效。
- 香味、風味皆宜的顆粒型藥劑。
- 從 5 歲到老年人都可以服用。

療效

胃脹、胃部不適、胃炎、胃痛、打嗝、食慾不振、腹部膨脹感、胸悶、胸口灼熱、胃酸過多、腹痛、噁心（反胃、噁心）

用法及用量

請將以下用量於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用：

成人（15 歲以上），1 次 1 包，1 天 3 次

5 歲～14 歲，1 次 1 / 2 包，1 天 3 次

未滿 5 歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

成分

1 包 (1.02g) 中

安中散 700mg

（桂枝 200mg，延胡索 150mg，牡蠣 150mg，茴香 75mg，縮沙 50mg，甘草 50mg，良薑 25mg）

芍藥甘草湯香 140mg

（芍藥 280mg，甘草 280mg）

添加劑

二氧化矽，馬鈴薯澱粉，乳糖，纖維素，羥丙基纖維素，滑石

注意事項

本藥劑採用天然藥材原料，因此產品色調等可能稍有不同，但藥效不變

使用上的注意事項

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹、發紅、搔癢
- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。
肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。
- 即使服用 1 個月左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- 單包分次服用時，請將袋口反折保管並於 2 天內服用完畢。
- 請勿服用超過使用期限的產品。

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。