

TAISHO STOMATITIS CHEWABLE TABLETS

第三類醫藥品
口腔潰瘍用藥

◆ 大正口腔潰瘍咀嚼錠，為能於口中迅速溶解，對刺痛的口腔潰瘍發揮優越效果的口腔潰瘍內服藥。■無須配服開水，隨時隨地便於服用。

療效或效果

口內炎
咽炎，扁桃體炎（喉嚨痛、喉嚨腫）

用法及用量

請將以下用量於口中咬碎或溶解後服用：
成人（15歲以上），1天3次，1次2片
7～14歲，1天3次，1次1片
未滿7歲者，請勿服用

成分及分量

6片中
傳明酸
750mg
甘草酸鉀
63mg
菸鹼醯胺
60mg
鹽酸吡哆辛(維生素B6)
50mg
核黃素
12mg

添加劑

纖維素，二氧化矽，玉米澱粉，D-甘露醇，交聯聚維酮，阿斯巴甜(L-苯丙氨酸化合物)，醋磺內酯鉀，三氯蔗糖，檸檬酸，硬脂酸鎂，香料，辛烯基丁二酸鈉澱粉

成分及分量相關的注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素B2的影響，無須擔憂

使用上的注意事項

禁止事項

- （若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）
- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。
含甘草或其成分甘草甜素口服藥物等
含傳明酸口服藥物等（鼻炎用內服藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮咳祛痰藥等）
 - 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
孕婦、哺乳中的婦女或可能懷孕者。
老年人。
曾因藥物等引發過敏症狀者。
有下列症狀的人。
浮腫
接受過下列診斷的人。
高血壓
心臟病
腎臟病
有血栓的人（腦血栓、心肌梗塞、血栓性靜脈炎）。
可能引發血栓症的人。
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：
發疹、發紅
發癢
消化器官：
噁心、嘔吐
胸口灼熱

食慾不振或食慾增加

精神神經系統：

頭暈

泌尿器官：

頻尿

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

假性醛固酮增多症、肌肉病變：除了手腳乏力、痠麻、抽筋感和僵硬之外，出現無力感、肌肉疼痛，且症狀漸漸變嚴重。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者腹瀉

●即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

本藥劑為避免光線造成變質，內袋（鋁箔袋）一經開封後，保存時請收入外盒並置於避免受光線照射之處保管。

請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。（為確保品質）

11

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。